


Les oiseaux à la mangeoire



Les mésanges

Cinq espèces de mésanges peuvent venir à la mangeoire. Les plus communes sont la mésange bleue et la mésange charbonnière. Mais on voit aussi souvent la mésange nonnette et parfois la mésange noire s'il y a des résineux à proximité. La mésange à longue queue viendra plus facilement sur des boules de graisses suspendues mais elle peut venir aussi à la mangeoire.



Mésange bleue
(*Cyanistes caeruleus*)




Mésange charbonnière
(*Parus major*)



Mésange nonnette
(*Poecile palustris*)



Mésange à longue queue
(*Aegithalos caudatus*)



Mésange noire
(*Periparus ater*)

La plupart des mésanges ne mangent pas directement dans la mangeoire. Elles viennent chercher une graine et s'en vont la déguster sur une branche à proximité. Puis elles reviennent se servir. On peut essayer de chronométrer le temps qu'elles mettent pour faire cela. Mais attention à bien suivre un seul oiseau car plusieurs viennent à la mangeoire...

Les forts en bec

Chardonneret élégant
 (*Carduelis carduelis*)



Pinson du nord
 (*Fringilla montifringilla*)



Grosbec casse-noyaux
 (*Coccothraustes coccothraustes*)

Tarin des aulnes
 (*Spinus spinus*)



Pinson des arbres
 (*Fringilla coelebs*)



Certaines espèces d'oiseaux sont spécialisées dans la consommation des graines toute l'année, ce sont les granivores. Évidemment, ils vont venir à la mangeoire. Parmi ceux-là, deux se rencontrent chez nous uniquement pendant l'hiver : c'est le pinson du nord et le tarin des aulnes. Ils nichent dans le nord et l'est de l'Europe et migrent chez nous en hiver quand ils ne trouvent plus de graines.

Verdier d'Europe
 (*Chloris chloris*)



Et quelques autres



Merle noir
 (*Turdus merula*)



Rougegorge familier
 (*Erithacus rubecula*)



Sittelle torchepot
 (*Sitta europaea*)

Le rougegorge, l'accenteur mouchet et le merle viendront plus souvent sous la mangeoire récupérer les restes que dans la mangeoire. La sittelle, elle, viendra dans la mangeoire mais plutôt seule alors que souvent ce sont des bandes de moineaux domestiques qui viendront au ravitaillement. Chaque espèce a son propre comportement pour venir à la mangeoire et celui-ci peut varier selon les autres oiseaux présents et la météo.



Accenteur mouchet
 (*Prunella modularis*)



Moineau domestique
 (*Passer domesticus*)

Quelques conseils et informations

Pour observer les oiseaux qui fréquentent votre mangeoire il faut faire attention de ne pas les déranger. L'idéal est de rester à bonne distance, bien au chaud derrière la fenêtre.

Observer les comportements des oiseaux à la mangeoire est passionnant. Vous verrez que certains ont du caractère et chassent les autres, alors que d'autres sont craintifs. Certains se nourrissent directement dans la mangeoire, d'autres au sol et d'autres encore ne font qu'un passage éclair le temps de prendre une graine.

Pensez à noter vos observations dans un carnet en notant la date, l'heure et la météo. Très vite, vous commencerez à comprendre comment ce petit monde s'organise.

Et vous pouvez contribuer à l'amélioration des connaissances sur les oiseaux de votre commune en transmettant les espèces observées sur un portail naturaliste en ligne.

En Auvergne, vous pouvez utiliser www.faune-auvergne.org